

Aanhef/ "kop" ziekenhuis

## **Patiënten informatie na Provocatietest op Dagbehandeling**

Geachte ouders,

Uw kind heeft vandaag een provocatietest ondergaan. De kans dat uw kind nog een ernstige reactie krijgt nadat u naar huis gaat is minimaal. Doordat deze dag vaak als vermoeiend wordt ervaren en uw kind andere voeding dan thuis heeft gekregen, kan uw kind wat hongerig zijn, andere ontlasting hebben of slecht slapen. Dit is niet verontrustend en wordt niet veroorzaakt door een allergische reactie.

Er zijn een paar klachten die wél met allergie te maken kunnen hebben, maar zeer weinig voorkomen. Deze brief geeft informatie over late klachten en welke maatregelen u kunt nemen.

1. uitbreiding eczeem gehele lichaam met hevige jeuk
  - hormoonzalf smeren
  - antihistaminica (Tavegil, Xyzal, Fenistil, Acrius, Zyrtec) eventueel voor de jeuk
  
2. braken en/of diarree
  - antihistaminica (zie boven) geven
  - bij fors braken/ diarree huisarts waarschuwen of naar dichtstbijzijnde EHBO
  
3. benauwdheid
  - antihistaminica (zie boven) geven, inhaleren (Ventolin of Bricanyl) met eigen inhaler bij een lange piepende uitademing.
  - huisarts waarschuwen of naar dichtstbijzijnde EHBO gaan

Bij onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de dienstdoende kinderarts van het ziekenhuis (*bereikbaar via telefoonnummer .....*).

De eerste dag na de provocatie neemt de arts of de nurse practitioner van de dagbehandeling telefonisch contact met u op om na te vragen of zich late reacties hebben voorgedaan en welke medicamenten uw kind eventueel heeft gebruikt.

Enkele weken na de provocatie neemt uw eigen arts telefonisch contact met u op om de uitslag van de test te bespreken en om het verdere beleid en dieet advies met u te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Namens het team Allergologie:

.....  
.....